

**Comité technique restreint  
« DPM/Baie de Bourgneuf »  
12 juin 2009  
Bouin**

Pour l'élaboration du document d'objectifs :

« Marais Breton, baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et forêt de Monts »  
Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR 5212009 relative à la Directive « Oiseaux »

---

## **Propositions d'actions sur la Baie de Bourgneuf**

**Opérateur local :**

**Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf**

Document de travail



# Les prés salés

Les grandes surfaces de prés salés jouent un rôle très important comme :

- Reposeur pour les limicoles migrateurs et hivernants (Huîtrier pie, Pluvier argenté, Bécasseau variable, Bécasseau maubèche, Barge rousse, Courlis cendré, Courlis corlieu...) qui les utilisent en reposeur de marée haute.
- Zone d'alimentation : ils sont le siège d'une forte productivité primaire et abritent de nombreux insectes et crustacés (Nurseries de poissons, apport de nourriture).
- Zone de reproduction pour un cortège de passereaux nicheurs (Gorgebleue, Cisticole, Linotte, Bruant des roseaux...), et quelques couples d'Avocette élégante et de Chevalier gambette.

## ENJEU 1 :

- **Maintenir et améliorer la capacité d'accueil des prés salés pour les oiseaux.**

## ENJEU 2

- **Favoriser les habitats de prés salés**

## Propositions d'actions

⇒ Améliorer la fonctionnalité des prés salés

exemples

Définition des zones de "non fréquentation" par les sportifs

Réalisation de panneaux et de documents d'information

....

⇒ Favoriser le développement des prés salés et leur état de conservation

exemples

Etude de la possibilité de mettre en pâturage

Mise en pâturage de nouveaux secteurs

Conservation des zones de prés salés en bordure des fossés du marais salé

...

# Les vasières et les récifs

La vasière a un rôle essentiel pour :

- le maintien des populations hivernantes et migratrices de Bernache cravant, de Tadorne de Belon, de Canard siffleur, de limicoles (zone d'alimentation, zone de reposoir).
- La production de ressources alimentaires pour la Spatule blanche, les Sternes, les Laridés et certains oiseaux nicheurs comme l'Avocette élégante, le Gravelot à collier interrompu et le Chevalier gambette.

Les récifs, milieu particulier de la vasière (rochers du médio et de l'infra littoral, récifs d'Hermelles), jouent probablement un rôle important pour les jeunes sternes avant la migration.

## ENJEU

- **Maintenir et améliorer la capacité d'accueil des vasières et récifs pour les oiseaux d'eau hivernants et migrants.**

⇒ Améliorer la fonctionnalité biologique de la vasière

### exemples

Travail en commun des collectivités, des associations de pêcheurs à pied, des pêcheurs professionnels et des associations de protection de la nature à la création de zones de tranquillité

Réalisation des panneaux et de documents d'information

...

⇒ Mieux comprendre le fonctionnement biologique de la baie de Bourgneuf

### exemple

Etudes

⇒ Favoriser la nidification des oiseaux dans les zones ostréicoles

### exemples

Travaux de reprofilage des berges des bassins et/ou des fonds de bassins

Gestion des niveaux d'eau dans les bassins non utilisés par les professionnels au printemps

...